

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГОСТРИМ ПОРУШЕННЯМ МЕЗЕНТЕРІАЛЬНОГО КРОВОБІГУ

*Степанченко О.М., Голуб А.М., лікарі-інтерни
Науковий керівник – проф. Кононенко М.Г.
СумДУ, кафедра госпітальної та факультетської хірургії*

Гостре порушення мезентеріального кровообігу (ГПМК) – найбільш драматична патологія невідкладної хірургії. Летальність сягає 72 – 95 %.

Представлено аналіз лікування 172 пацієнтів двох хірургічних відділень 5 Сумської МКЛ за 1993 – 2003 рр. Чоловіків було 79, жінок 93. Вік хворих становив від 20 до 95 років, причому старше 60 років було 148 пацієнтів (86 %).

З 172 хворих прооперовано 135 (78,5 %), не оперовано 37 (21,5 %). Із 135 у 82 (60,7 %) пацієнтів проведені діагностичні і паліативні втручання. Радикальні операції виконані у 53 (39,3%).

З 172 хворих померло 128 (74,4 %), більшість з них в найближчі дні і години після госпіталізації чи операції. Із 135 прооперованих помер 101 (74,8 %), після радикальних операцій із 53 хворих померло 30 (56,6 %).

З 172 чоловік виписано 34, із яких у 26 вивчено віддалені результати лікування. У 12 пацієнтів симптомів ентеральної недостатності не було. Синдром вкороченого кишечника виник у 14 (53,8 %) хворих.

З 26 виписаних, за час, що минув від операції, померло 9 чоловік. Від ентеральної недостатності помер тільки один хворий (через 6 місяців після оперативного втручання).

Лікування пацієнтів з ГПМК потребує розроблення більш ефективних методів діагностики та лікування.